

表 678 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	423	1,990	2,413	39	1,166	3,618
(%)	(17.5)	(82.5)	(100.0)			
2年～	443	1,547	1,990	9	985	2,984
(%)	(22.3)	(77.7)	(100.0)			
5年～	212	822	1,034	4	537	1,575
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			
10年～	60	155	215	3	71	289
(%)	(27.9)	(72.1)	(100.0)			
15年～	24	41	65	1	19	85
(%)	(36.9)	(63.1)	(100.0)			
20年～	10	12	22		6	28
(%)	(45.5)	(54.5)	(100.0)			
25年～	1	3	4		5	9
(%)	(25.0)	(75.0)	(100.0)			
30年～	2	3	5		1	6
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
35年～					1	1
(%)						
40年～	1	1	2			2
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
合計	1,176	4,574	5,750	56	2,791	8,597
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			
不明	1	1	2		16	18
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	1,177	4,575	5,752	56	2,807	8,615
(%)	(20.5)	(79.5)	(100.0)			
平均	3.62	2.94	3.08	1.93	2.94	3.03
標準偏差	4.31	3.41	3.62	3.66	3.29	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0742##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査