

表 682 嘸煙の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	143,253 (88.2)	19,130 (11.8)	162,383 (100.0)	11,456	59,865	233,704
Off-line HDF (%)	2,861 (87.4)	412 (12.6)	3,273 (100.0)	256	1,108	4,637
On-line HDF (%)	36,045 (86.9)	5,433 (13.1)	41,478 (100.0)	2,772	14,866	59,116
Push/Pull HDF (%)	30 (78.9)	8 (21.1)	38 (100.0)		28	66
バイオフィルトレーション (%)	163 (91.1)	16 (8.9)	179 (100.0)	7	66	252
IHDF (%)	6,865 (89.1)	836 (10.9)	7,701 (100.0)	709	2,318	10,728
血液濾過 (%)	8 (80.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	4	5	19
血液吸着透析 (リクセル等使用) (%)	962 (90.6)	100 (9.4)	1,062 (100.0)	50	243	1,355
在宅血液透析 (%)	374 (93.3)	27 (6.7)	401 (100.0)	83	133	617
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,729 (90.1)	300 (9.9)	3,029 (100.0)	282	1,662	4,973
腹膜透析 (APD) (%)	1,409 (90.4)	150 (9.6)	1,559 (100.0)	178	900	2,637
腹膜透析 (CCPD) (%)	560 (88.7)	71 (11.3)	631 (100.0)	58	316	1,005
合計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

#D0811##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査