

表 686 嘸煙の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	42,794 (88.1)	5,794 (11.9)	48,588 (100.0)	3,782	18,168	70,538
2年～ (%)	48,686 (88.0)	6,661 (12.0)	55,347 (100.0)	3,839	20,982	80,168
5年～ (%)	48,064 (87.3)	6,983 (12.7)	55,047 (100.0)	3,857	20,241	79,145
10年～ (%)	25,114 (87.8)	3,491 (12.2)	28,605 (100.0)	1,979	9,972	40,556
15年～ (%)	13,808 (89.0)	1,698 (11.0)	15,506 (100.0)	1,133	5,455	22,094
20年～ (%)	7,862 (89.3)	944 (10.7)	8,806 (100.0)	586	3,092	12,484
25年～ (%)	4,387 (90.3)	470 (9.7)	4,857 (100.0)	323	1,717	6,897
30年～ (%)	2,519 (90.6)	262 (9.4)	2,781 (100.0)	185	1,021	3,987
35年～ (%)	1,412 (91.0)	139 (9.0)	1,551 (100.0)	112	489	2,152
40年～ (%)	545 (93.3)	39 (6.7)	584 (100.0)	42	167	793
合計 (%)	195,191 (88.1)	26,481 (11.9)	221,672 (100.0)	15,838	81,304	318,814
不明 (%)	68 (94.4)	4 (5.6)	72 (100.0)	17	206	295
記載なし (%)						
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109
平均	7.46	7.04	7.41	7.23	7.19	7.35
標準偏差	7.70	7.13	7.64	7.61	7.50	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0815##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査