

表 687 喫煙の有無 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	57,116 (89.7)	6,551 (10.3)	63,667 (100.0)	4,598	23,518	91,783
慢性腎孟腎炎 (%)	1,882 (90.2)	205 (9.8)	2,087 (100.0)	113	696	2,896
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,628 (90.1)	179 (9.9)	1,807 (100.0)	118	613	2,538
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,023 (95.9)	44 (4.1)	1,067 (100.0)	62	354	1,483
その他の分類不能の腎炎 (%)	882 (89.9)	99 (10.1)	981 (100.0)	64	409	1,454
多発性囊胞腎 (%)	7,377 (91.0)	733 (9.0)	8,110 (100.0)	573	2,788	11,471
腎硬化症 (%)	20,347 (90.0)	2,249 (10.0)	22,596 (100.0)	1,450	7,604	31,650
悪性高血圧 (%)	1,580 (82.7)	331 (17.3)	1,911 (100.0)	163	647	2,721
糖尿病性腎症 (%)	73,596 (85.5)	12,500 (14.5)	86,096 (100.0)	6,122	31,439	123,657
SLE腎炎 (%)	1,439 (91.2)	139 (8.8)	1,578 (100.0)	108	536	2,222
アミロイド腎 (%)	280 (94.3)	17 (5.7)	297 (100.0)	24	117	438
痛風腎 (%)	644 (84.8)	115 (15.2)	759 (100.0)	56	241	1,056
先天性代謝異常による腎不全 (%)	178 (89.0)	22 (11.0)	200 (100.0)	18	63	281
腎・尿路結核 (%)	103 (92.0)	9 (8.0)	112 (100.0)	6	50	168
腎・尿路結石 (%)	374 (87.8)	52 (12.2)	426 (100.0)	30	122	578
腎・尿路腫瘍 (%)	626 (89.0)	77 (11.0)	703 (100.0)	36	220	959
閉塞性尿路障害 (%)	447 (85.5)	76 (14.5)	523 (100.0)	40	180	743
骨髓腫 (%)	213 (92.6)	17 (7.4)	230 (100.0)	15	78	323
腎形成不全 (%)	430 (90.3)	46 (9.7)	476 (100.0)	29	159	664
不明 (%)	18,722 (89.5)	2,197 (10.5)	20,919 (100.0)	1,671	8,822	31,412
再導入 (%)	1,322 (87.3)	192 (12.7)	1,514 (100.0)	119	541	2,174
その他 (%)	5,050 (88.8)	635 (11.2)	5,685 (100.0)	440	2,313	8,438
合計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	195,259 (88.1)	26,485 (11.9)	221,744 (100.0)	15,855	81,510	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D0816##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査