

表 704 腹膜透析の経験 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点で カテーテル あり	年末時点で カテーテル なし				
施設血液透析	164,959	974	4,853	170,786	920	61,998	233,704
(%)	(96.6)	(0.6)	(2.8)	(100.0)			
血液透析濾過	52,618	320	2,196	55,134	70	19,595	74,799
(%)	(95.4)	(0.6)	(4.0)	(100.0)			
血液濾過	13		1	14		5	19
(%)	(92.9)		(7.1)	(100.0)			
血液吸着透析	966	3	48	1,017	11	327	1,355
(%)	(95.0)	(0.3)	(4.7)	(100.0)			
在宅血液透析	418	17	82	517	1	99	617
(%)	(80.9)	(3.3)	(15.9)	(100.0)			
腹膜透析		6,283	43	6,326		2,289	8,615
(%)		(99.3)	(0.7)	(100.0)			
合計	218,974	7,597	7,223	233,794	1,002	84,313	319,109
(%)	(93.7)	(3.2)	(3.1)	(100.0)			
記載なし							
(%)							
総計	218,974	7,597	7,223	233,794	1,002	84,313	319,109
(%)	(93.7)	(3.2)	(3.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0910##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査