

表 805 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

n P C R	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (20.0)	4 (80.0)			5 (100.0)			5
0.4～ (%)	15 (15.3)	83 (84.7)			98 (100.0)		8	106
0.6～ (%)	72 (11.7)	543 (87.9)	3 (0.5)		618 (100.0)		69	687
0.8～ (%)	124 (14.4)	738 (85.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	864 (100.0)		75	939
1.0～ (%)	42 (14.2)	254 (85.8)			296 (100.0)		24	320
1.2～ (%)	5 (9.3)	48 (88.9)	1 (1.9)		54 (100.0)		6	60
1.4～ (%)	2 (28.6)	5 (71.4)			7 (100.0)		1	8
1.6～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
1.8～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
2.0～ (%)								
合計 (%)	261 (13.4)	1,677 (86.3)	5 (0.3)	1 (0.1)	1,944 (100.0)		183	2,127
記載なし (%)	24 (15.6)	130 (84.4)			154 (100.0)		47	201
総計 (%)	285 (13.6)	1,807 (86.1)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,098 (100.0)		230	2,328
平均	0.86	0.85	0.86	0.85	0.85		0.84	0.85
標準偏差	0.17	0.17	0.26		0.17		0.17	0.17

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1622##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査