

表 807 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)								
20~ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
30~ (%)	6 (17.6)	28 (82.4)			34 (100.0)		4	38
40~ (%)	51 (13.4)	329 (86.4)	1 (0.3)		381 (100.0)		49	430
50~ (%)	99 (13.5)	633 (86.4)	1 (0.1)		733 (100.0)		78	811
60~ (%)	78 (14.0)	475 (85.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	556 (100.0)		50	606
70~ (%)	26 (11.9)	192 (88.1)			218 (100.0)		25	243
80~ (%)	14 (15.9)	73 (83.0)	1 (1.1)		88 (100.0)		5	93
90~ (%)	4 (11.1)	32 (88.9)			36 (100.0)		4	40
100~ (%)	1 (14.3)	6 (85.7)			7 (100.0)			7
110~ (%)		4 (100.0)			4 (100.0)		2	6
120~ (%)		8 (100.0)			8 (100.0)			8
合計 (%)	279 (13.5)	1,782 (86.2)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,067 (100.0)		217	2,284
記載なし (%)	6 (19.4)	25 (80.6)			31 (100.0)		13	44
総計 (%)	285 (13.6)	1,807 (86.1)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,098 (100.0)		230	2,328
平均	59.42	60.28	63.62	64.80	60.17		59.00	60.06
標準偏差	12.02	12.96	15.93		12.84		12.68	12.83

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1624##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査