

表 896 身長(cm) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	56	38	74	296	1,361	6,454	17,286	32,819	33,818	22,196	8,194	2,231	344	51	125,218	10,232	135,450	164.92	7.13
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(5.2)	(13.8)	(26.2)	(27.0)	(17.7)	(6.5)	(1.8)	(0.3)	(0.0)	(100.0)				
女性	130	470	2,005	7,336	15,747	20,516	14,277	6,002	1,502	266	53	8	4	1	68,317	5,768	74,085	151.33	6.88
(%)	(0.2)	(0.7)	(2.9)	(10.7)	(23.0)	(30.0)	(20.9)	(8.8)	(2.2)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	186	508	2,079	7,632	17,108	26,970	31,563	38,821	35,320	22,462	8,247	2,239	348	52	193,535	16,000	209,535	160.13	9.58
(%)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(3.9)	(8.8)	(13.9)	(16.3)	(20.1)	(18.2)	(11.6)	(4.3)	(1.2)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				
記載なし																1	1		
(%)																			
総計	186	508	2,079	7,632	17,108	26,970	31,563	38,821	35,320	22,462	8,247	2,239	348	52	193,535	16,001	209,536	160.13	9.58
(%)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(3.9)	(8.8)	(13.9)	(16.3)	(20.1)	(18.2)	(11.6)	(4.3)	(1.2)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
##D2020##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査