

表 972 透析前BUN(mg/dL) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	114 (0.2)	610 (1.3)	2,430 (5.1)	6,794 (14.2)	11,425 (23.8)	12,505 (26.1)	8,383 (17.5)	3,816 (8.0)	1,333 (2.8)	378 (0.8)	94 (0.2)	45 (0.1)	47,927 (100.0)	1,306	49,233	61.79	15.25
慢性腎盂腎炎 (%)	7 (0.5)	30 (2.0)	89 (5.8)	221 (14.5)	364 (23.9)	389 (25.5)	250 (16.4)	125 (8.2)	34 (2.2)	11 (0.7)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,523 (100.0)	30	1,553	60.92	15.61
急速進行性糸球体腎炎 (%)	4 (0.3)	26 (2.2)	68 (5.8)	194 (16.6)	281 (24.0)	302 (25.8)	181 (15.4)	84 (7.2)	24 (2.0)	6 (0.5)	2 (0.2)		1,172 (100.0)	39	1,211	59.94	15.32
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.1)	5 (0.6)	36 (4.5)	108 (13.6)	198 (25.0)	183 (23.1)	146 (18.4)	78 (9.8)	29 (3.7)	8 (1.0)	1 (0.1)		793 (100.0)	17	810	63.03	15.33
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	4 (0.6)	44 (6.4)	90 (13.1)	172 (25.1)	164 (23.9)	119 (17.3)	66 (9.6)	16 (2.3)	9 (1.3)	1 (0.1)		686 (100.0)	23	709	62.04	15.43
多発性嚢胞腎 (%)	17 (0.3)	65 (1.1)	261 (4.3)	826 (13.6)	1,575 (25.9)	1,653 (27.2)	1,007 (16.6)	457 (7.5)	170 (2.8)	32 (0.5)	9 (0.1)	3 (0.0)	6,075 (100.0)	162	6,237	61.67	14.56
腎硬化症 (%)	46 (0.3)	259 (1.8)	987 (6.9)	2,432 (17.0)	3,650 (25.4)	3,465 (24.2)	2,133 (14.9)	916 (6.4)	340 (2.4)	79 (0.6)	22 (0.2)	15 (0.1)	14,344 (100.0)	347	14,691	59.41	15.42
悪性高血圧 (%)	3 (0.2)	22 (1.7)	73 (5.6)	187 (14.3)	325 (24.8)	312 (23.8)	219 (16.7)	115 (8.8)	40 (3.1)	9 (0.7)	3 (0.2)	2 (0.2)	1,310 (100.0)	59	1,369	61.53	15.81
糖尿病性腎症 (%)	203 (0.3)	1,342 (2.2)	4,955 (8.2)	11,543 (19.1)	15,847 (26.2)	13,776 (22.8)	7,772 (12.8)	3,433 (5.7)	1,128 (1.9)	341 (0.6)	103 (0.2)	43 (0.1)	60,486 (100.0)	1,751	62,237	57.87	15.43
SLE腎炎 (%)	2 (0.2)	7 (0.7)	53 (5.0)	142 (13.4)	245 (23.1)	264 (24.9)	203 (19.2)	98 (9.3)	30 (2.8)	10 (0.9)	4 (0.4)	1 (0.1)	1,059 (100.0)	36	1,095	62.88	15.44
アミロイド腎 (%)	1 (0.5)	6 (3.1)	19 (9.9)	28 (14.7)	42 (22.0)	46 (24.1)	24 (12.6)	16 (8.4)	7 (3.7)	1 (0.5)	1 (0.5)		191 (100.0)	5	196	59.24	17.21
痛風腎 (%)	1 (0.2)	8 (1.4)	29 (5.0)	81 (14.0)	132 (22.9)	148 (25.6)	98 (17.0)	50 (8.7)	15 (2.6)	9 (1.6)	6 (1.0)		577 (100.0)	20	597	62.53	16.46
先天性代謝異常による腎不全 (%)	4 (3.0)	2 (1.5)	7 (5.2)	21 (15.6)	24 (17.8)	31 (23.0)	21 (15.6)	15 (11.1)	6 (4.4)	3 (2.2)	1 (0.7)		135 (100.0)	2	137	62.44	19.04
腎・尿路結核 (%)		2 (2.2)	9 (10.1)	18 (20.2)	15 (16.9)	20 (22.5)	15 (16.9)	7 (7.9)	3 (3.4)				89 (100.0)	5	94	59.42	15.79
腎・尿路結石 (%)	1 (0.3)	9 (3.1)	18 (6.1)	55 (18.8)	67 (22.9)	69 (23.5)	34 (11.6)	27 (9.2)	9 (3.1)	2 (0.7)		2 (0.7)	293 (100.0)	11	304	59.77	17.29
腎・尿路腫瘍 (%)		7 (1.6)	28 (6.5)	59 (13.6)	129 (29.8)	105 (24.2)	63 (14.5)	30 (6.9)	7 (1.6)	4 (0.9)		1 (0.2)	433 (100.0)	9	442	60.06	14.76
閉塞性尿路障害 (%)		4 (1.2)	25 (7.3)	64 (18.6)	82 (23.8)	68 (19.8)	61 (17.7)	27 (7.8)	6 (1.7)	5 (1.5)	2 (0.6)		344 (100.0)	11	355	60.53	16.10
骨髄腫 (%)			12 (13.5)	14 (15.7)	19 (21.3)	23 (25.8)	12 (13.5)	6 (6.7)	2 (2.2)	1 (1.1)			89 (100.0)	3	92	58.76	16.00
腎形成不全 (%)	1 (0.3)	3 (0.9)	8 (2.5)	29 (9.0)	71 (22.0)	84 (26.1)	75 (23.3)	30 (9.3)	19 (5.9)	2 (0.6)			322 (100.0)	4	326	65.42	14.82
不明 (%)	46 (0.3)	299 (2.1)	967 (6.9)	2,288 (16.3)	3,528 (25.1)	3,357 (23.8)	2,138 (15.2)	983 (7.0)	340 (2.4)	87 (0.6)	32 (0.2)	13 (0.1)	14,078 (100.0)	598	14,676	59.72	15.83
再導入 (%)		10 (1.1)	34 (3.6)	95 (10.1)	209 (22.2)	252 (26.8)	192 (20.4)	96 (10.2)	37 (3.9)	12 (1.3)	2 (0.2)	2 (0.2)	941 (100.0)	26	967	64.71	15.47
その他 (%)	14 (0.4)	70 (1.9)	217 (5.8)	578 (15.5)	877 (23.6)	953 (25.6)	559 (15.0)	300 (8.1)	103 (2.8)	32 (0.9)	10 (0.3)	6 (0.2)	3,719 (100.0)	83	3,802	60.89	16.05
合計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547	161,133	59.84	15.51
記載なし (%)																	
総計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547	161,133	59.84	15.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2613##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査