

表 986 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	42 (0.1)	798 (1.5)	3,446 (6.6)	9,624 (18.6)	14,879 (28.7)	12,657 (24.4)	6,924 (13.4)	2,615 (5.0)	836 (1.6)	51,821 (100.0)	1,541	53,362	9.68	2.80
5年～ (%)	21 (0.0)	489 (1.0)	2,366 (4.6)	7,196 (14.0)	13,650 (26.6)	13,877 (27.1)	8,874 (17.3)	3,557 (6.9)	1,215 (2.4)	51,245 (100.0)	1,479	52,724	10.28	2.79
10年～ (%)	5 (0.0)	178 (0.7)	1,029 (4.0)	3,187 (12.3)	6,735 (25.9)	7,392 (28.5)	4,798 (18.5)	1,955 (7.5)	677 (2.6)	25,956 (100.0)	751	26,707	10.49	2.75
15年～ (%)	2 (0.0)	82 (0.6)	473 (3.5)	1,590 (11.8)	3,328 (24.6)	4,119 (30.5)	2,550 (18.9)	1,050 (7.8)	320 (2.4)	13,514 (100.0)	434	13,948	10.57	2.68
20年～ (%)		31 (0.4)	214 (3.0)	777 (10.9)	1,867 (26.2)	2,217 (31.1)	1,345 (18.8)	546 (7.7)	139 (1.9)	7,136 (100.0)	215	7,351	10.59	2.55
25年～ (%)		17 (0.5)	120 (3.3)	491 (13.5)	1,028 (28.4)	1,089 (30.0)	645 (17.8)	192 (5.3)	43 (1.2)	3,625 (100.0)	98	3,723	10.25	2.50
30年～ (%)		22 (1.1)	73 (3.8)	314 (16.3)	641 (33.4)	539 (28.1)	263 (13.7)	64 (3.3)	5 (0.3)	1,921 (100.0)	48	1,969	9.74	2.35
35年～ (%)		8 (0.8)	73 (7.6)	202 (20.9)	358 (37.1)	229 (23.7)	78 (8.1)	16 (1.7)	2 (0.2)	966 (100.0)	30	996	9.06	2.23
40年～ (%)		5 (1.4)	48 (13.8)	107 (30.8)	114 (32.9)	63 (18.2)	7 (2.0)	1 (0.3)	2 (0.6)	347 (100.0)	6	353	8.21	2.13
合計 (%)	70 (0.0)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (2.1)	156,531 (100.0)	4,602	161,133	10.14	2.78
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	70 (0.0)	1,630 (1.0)	7,842 (5.0)	23,488 (15.0)	42,600 (27.2)	42,182 (26.9)	25,484 (16.3)	9,996 (6.4)	3,239 (2.1)	156,531 (100.0)	4,602	161,133	10.14	2.78
平均	4.90	6.89	7.68	8.13	8.82	9.31	9.33	9.23	8.81	8.88	8.83	8.88		
標準偏差	3.27	6.46	7.13	7.31	7.33	7.08	6.68	6.29	5.75	7.06	6.96	7.06		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2712##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査