

表 1007 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	10 (0.1)	10 (0.1)	25 (0.1)	241 (1.3)	1,131 (6.0)	3,648 (19.4)	5,201 (27.6)	4,187 (22.2)	2,476 (13.2)	1,895 (10.1)	18,824 (100.0)	1,876	20,700	1.59	0.31
慢性腎盂腎炎 (%)				4 (0.8)	19 (3.7)	88 (16.9)	131 (25.2)	128 (24.6)	89 (17.1)	61 (11.7)	520 (100.0)	51	571	1.64	0.30
急速進行性糸球体腎炎 (%)		1 (0.3)	1 (0.3)	6 (1.7)	19 (5.3)	60 (16.7)	86 (23.9)	90 (25.0)	58 (16.1)	39 (10.8)	360 (100.0)	37	397	1.61	0.31
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)				1 (0.2)	11 (2.6)	37 (8.9)	77 (18.5)	107 (25.7)	101 (24.3)	82 (19.7)	416 (100.0)	31	447	1.77	0.31
その他の分類不能の腎炎 (%)			1 (0.3)	5 (1.7)	16 (5.6)	50 (17.5)	85 (29.7)	57 (19.9)	47 (16.4)	25 (8.7)	286 (100.0)	31	317	1.59	0.31
多発性嚢胞腎 (%)	2 (0.1)		7 (0.3)	42 (2.0)	199 (9.5)	525 (25.0)	630 (29.9)	378 (18.0)	198 (9.4)	123 (5.8)	2,104 (100.0)	209	2,313	1.51	0.30
腎硬化症 (%)	3 (0.1)	5 (0.1)	12 (0.3)	67 (1.6)	393 (9.5)	1,037 (25.1)	1,186 (28.7)	761 (18.4)	402 (9.7)	261 (6.3)	4,127 (100.0)	417	4,544	1.51	0.29
悪性高血圧 (%)			2 (0.5)	18 (4.1)	49 (11.1)	107 (24.3)	148 (33.6)	71 (16.1)	33 (7.5)	12 (2.7)	440 (100.0)	34	474	1.46	0.28
糖尿病性腎症 (%)	17 (0.1)	13 (0.1)	77 (0.4)	498 (2.8)	2,272 (12.8)	5,229 (29.6)	5,062 (28.6)	2,707 (15.3)	1,184 (6.7)	630 (3.6)	17,689 (100.0)	2,093	19,782	1.44	0.28
SLE腎炎 (%)				3 (0.7)	18 (4.2)	60 (14.0)	86 (20.0)	103 (24.0)	82 (19.1)	78 (18.1)	430 (100.0)	50	480	1.70	0.33
アミロイド腎 (%)				1 (1.6)	1 (1.6)	15 (23.8)	15 (23.8)	16 (25.4)	5 (7.9)	10 (15.9)	63 (100.0)	7	70	1.60	0.28
痛風腎 (%)			1 (0.5)	4 (2.1)	13 (6.8)	58 (30.2)	58 (30.2)	30 (15.6)	20 (10.4)	8 (4.2)	192 (100.0)	15	207	1.49	0.29
先天性代謝異常による腎不全 (%)				1 (1.7)	4 (6.9)	8 (13.8)	14 (24.1)	18 (31.0)	4 (6.9)	9 (15.5)	58 (100.0)	8	66	1.63	0.33
腎・尿路結核 (%)					6 (16.2)	3 (8.1)	12 (32.4)	4 (10.8)	6 (16.2)	6 (16.2)	37 (100.0)	3	40	1.61	0.33
腎・尿路結石 (%)				3 (3.4)	5 (5.7)	23 (26.1)	21 (23.9)	21 (23.9)	10 (11.4)	5 (5.7)	88 (100.0)	12	100	1.53	0.28
腎・尿路腫瘍 (%)				4 (3.1)	17 (13.0)	35 (26.7)	30 (22.9)	27 (20.6)	10 (7.6)	8 (6.1)	131 (100.0)	8	139	1.49	0.31
閉塞性尿路障害 (%)		1 (0.8)	1 (0.8)	3 (2.3)	10 (7.8)	24 (18.6)	32 (24.8)	23 (17.8)	22 (17.1)	13 (10.1)	129 (100.0)	3	132	1.58	0.35
骨髄腫 (%)	1 (4.8)				5 (23.8)	5 (23.8)	3 (14.3)	5 (23.8)		2 (9.5)	21 (100.0)	1	22	1.42	0.42
腎形成不全 (%)					8 (5.5)	23 (15.9)	40 (27.6)	26 (17.9)	31 (21.4)	17 (11.7)	145 (100.0)	8	153	1.66	0.32
不明 (%)	2 (0.0)	8 (0.2)	21 (0.4)	88 (1.8)	456 (9.4)	1,080 (22.2)	1,319 (27.1)	947 (19.4)	533 (10.9)	418 (8.6)	4,872 (100.0)	532	5,404	1.54	0.32
再導入 (%)			1 (0.2)	3 (0.6)	31 (5.9)	92 (17.5)	136 (25.8)	116 (22.0)	76 (14.4)	72 (13.7)	527 (100.0)	37	564	1.64	0.33
その他 (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	6 (0.5)	27 (2.1)	108 (8.5)	287 (22.7)	307 (24.3)	250 (19.8)	148 (11.7)	128 (10.1)	1,264 (100.0)	144	1,408	1.56	0.34
合計 (%)	37 (0.1)	39 (0.1)	155 (0.3)	1,019 (1.9)	4,791 (9.1)	12,494 (23.7)	14,679 (27.8)	10,072 (19.1)	5,535 (10.5)	3,902 (7.4)	52,723 (100.0)	5,607	58,330	1.53	0.31
記載なし (%)															
総計 (%)	37 (0.1)	39 (0.1)	155 (0.3)	1,019 (1.9)	4,791 (9.1)	12,494 (23.7)	14,679 (27.8)	10,072 (19.1)	5,535 (10.5)	3,902 (7.4)	52,723 (100.0)	5,607	58,330	1.53	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2823##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査