

表 1021 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	120 (0.3)	3,127 (6.7)	16,740 (35.9)	19,537 (41.8)	6,109 (13.1)	953 (2.0)	91 (0.2)	10 (0.0)	1 (0.0)		46,688 (100.0)	6,674	53,362	0.83	0.17
5年～ (%)	97 (0.2)	2,729 (5.8)	15,558 (33.3)	19,822 (42.4)	7,247 (15.5)	1,194 (2.6)	120 (0.3)	16 (0.0)	4 (0.0)	3 (0.0)	46,790 (100.0)	5,934	52,724	0.85	0.17
10年～ (%)	53 (0.2)	1,212 (5.1)	7,170 (30.1)	10,338 (43.4)	4,201 (17.6)	738 (3.1)	97 (0.4)	3 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	23,816 (100.0)	2,891	26,707	0.86	0.17
15年～ (%)	23 (0.2)	517 (4.2)	3,310 (26.6)	5,575 (44.8)	2,523 (20.3)	440 (3.5)	54 (0.4)	5 (0.0)			12,447 (100.0)	1,501	13,948	0.88	0.17
20年～ (%)	10 (0.2)	233 (3.5)	1,645 (24.9)	2,983 (45.1)	1,443 (21.8)	261 (3.9)	33 (0.5)	3 (0.0)			6,611 (100.0)	740	7,351	0.89	0.17
25年～ (%)	5 (0.1)	120 (3.6)	841 (25.1)	1,495 (44.6)	728 (21.7)	145 (4.3)	15 (0.4)		1 (0.0)		3,350 (100.0)	373	3,723	0.89	0.17
30年～ (%)	5 (0.3)	57 (3.2)	440 (24.7)	787 (44.2)	411 (23.1)	75 (4.2)	5 (0.3)	1 (0.1)			1,781 (100.0)	188	1,969	0.89	0.18
35年～ (%)	1 (0.1)	42 (4.8)	234 (26.7)	392 (44.8)	166 (19.0)	40 (4.6)					875 (100.0)	121	996	0.88	0.17
40年～ (%)	1 (0.3)	14 (4.4)	100 (31.7)	122 (38.7)	62 (19.7)	15 (4.8)	1 (0.3)				315 (100.0)	38	353	0.87	0.18
合計 (%)	315 (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	315 (0.2)	8,051 (5.6)	46,038 (32.3)	61,051 (42.8)	22,890 (16.0)	3,861 (2.7)	416 (0.3)	38 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	142,673 (100.0)	18,460	161,133	0.85	0.17
平均	8.29	7.73	8.18	9.10	10.12	10.66	10.63	9.26	10.11	8.25	8.93	8.46	8.88		
標準偏差	6.90	6.30	6.65	7.14	7.58	7.92	7.04	6.93	7.77	3.40	7.08	6.91	7.06		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3012##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査