

表 1029 %クレアチニン産生速度(%) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	6,671 (7.5)	4,899 (5.5)	7,706 (8.6)	10,891 (12.2)	13,630 (15.2)	14,808 (16.5)	13,097 (14.6)	9,147 (10.2)	5,153 (5.8)	3,494 (3.9)	89,496 (100.0)	12,994	102,490	98.77	25.56
女性 (%)	4,383 (8.6)	2,830 (5.6)	4,433 (8.7)	6,063 (11.9)	7,525 (14.8)	8,295 (16.3)	7,180 (14.1)	5,276 (10.4)	2,900 (5.7)	1,933 (3.8)	50,818 (100.0)	7,825	58,643	97.93	26.36
合計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86
記載なし (%)															
総計 (%)	11,054 (7.9)	7,729 (5.5)	12,139 (8.7)	16,954 (12.1)	21,155 (15.1)	23,103 (16.5)	20,277 (14.5)	14,423 (10.3)	8,053 (5.7)	5,427 (3.9)	140,314 (100.0)	20,819	161,133	98.46	25.86

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D3110##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査