

表 1052 糖尿病の有無 被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往別 (透析患者全体)

被嚢性腹膜硬化症 (EPS)の既往	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	118,487	109,235	227,722	1,410		229,132
(%)	(52.0)	(48.0)	(100.0)			
あり 剥離手術既往あり ステロイド使用歴あり	416	176	592	80		672
(%)	(70.3)	(29.7)	(100.0)			
ステロイド使用歴なし	28	12	40			40
(%)	(70.0)	(30.0)	(100.0)			
剥離手術既往なし ステロイド使用歴あり	60	18	78	4		82
(%)	(76.9)	(23.1)	(100.0)			
ステロイド使用歴なし	56	19	75			75
(%)	(74.7)	(25.3)	(100.0)			
合計	119,047	109,460	228,507	1,494		230,001
(%)	(52.1)	(47.9)	(100.0)			
不明	1,722	1,707	3,429	130		3,559
(%)	(50.2)	(49.8)	(100.0)			
記載なし	5,006	38,835	43,841	41,708		85,549
(%)	(11.4)	(88.6)	(100.0)			
総計	125,775	150,002	275,777	43,332		319,109
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3223##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査