

表 1059 糖尿病の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	4,874 (44.5)	6,091 (55.5)	10,965 (100.0)	1,239		12,204
3.0 ~ (%)	5,779 (45.0)	7,062 (55.0)	12,841 (100.0)	1,391		14,232
3.5 ~ (%)	10,304 (45.8)	12,192 (54.2)	22,496 (100.0)	2,483		24,979
4.0 ~ (%)	15,140 (46.9)	17,171 (53.1)	32,311 (100.0)	3,626		35,937
4.5 ~ (%)	18,633 (48.0)	20,200 (52.0)	38,833 (100.0)	4,298		43,131
5.0 ~ (%)	18,935 (48.4)	20,219 (51.6)	39,154 (100.0)	4,265		43,419
5.5 ~ (%)	16,332 (48.8)	17,133 (51.2)	33,465 (100.0)	3,794		37,259
6.0 ~ (%)	2,727 (47.9)	2,972 (52.1)	5,699 (100.0)	619		6,318
6.1 ~ (%)	9,282 (48.0)	10,045 (52.0)	19,327 (100.0)	2,267		21,594
6.5 ~ (%)	8,108 (47.5)	8,947 (52.5)	17,055 (100.0)	1,806		18,861
7.0 ~ (%)	5,012 (47.4)	5,556 (52.6)	10,568 (100.0)	1,059		11,627
7.5 ~ (%)	2,964 (46.5)	3,413 (53.5)	6,377 (100.0)	658		7,035
8.0 ~ (%)	1,698 (44.5)	2,122 (55.5)	3,820 (100.0)	414		4,234
8.5 ~ (%)	1,111 (46.2)	1,296 (53.8)	2,407 (100.0)	253		2,660
9.0 ~ (%)	1,724 (45.8)	2,040 (54.2)	3,764 (100.0)	445		4,209
合計 (%)	122,623 (47.3)	136,459 (52.7)	259,082 (100.0)	28,617		287,699
記載なし (%)	3,152 (18.9)	13,543 (81.1)	16,695 (100.0)	14,715		31,410
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	5.21	5.19	5.20	5.19		5.20
標準偏差	1.42	1.46	1.44	1.44		1.44

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3230##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査