

表 1064 糖尿病の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前 収縮期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満	27 (%)	11 (28.9)	38 (100.0)	8		46
60 ~	319 (%)	137 (30.0)	456 (100.0)	53		509
80 ~	2,280 (%)	1,304 (36.4)	3,584 (100.0)	560		4,144
100 ~	11,120 (%)	7,560 (40.5)	18,680 (100.0)	2,509		21,189
120 ~	30,571 (%)	24,568 (44.6)	55,139 (100.0)	6,834		61,973
140 ~	41,057 (%)	42,304 (50.7)	83,361 (100.0)	9,178		92,539
160 ~	24,958 (%)	35,427 (58.7)	60,385 (100.0)	5,706		66,091
180 ~	7,608 (%)	15,830 (67.5)	23,438 (100.0)	1,862		25,300
200 ~	1,461 (%)	4,419 (75.2)	5,880 (100.0)	350		6,230
220 ~	230 (%)	1,014 (81.5)	1,244 (100.0)	57		1,301
合計	119,631 (%)	132,574 (52.6)	252,205 (100.0)	27,117		279,322
記載なし	6,144 (%)	17,428 (73.9)	23,572 (100.0)	16,215		39,787
総計	125,775 (%)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	146.67	155.37	151.25	146.95		150.83
標準偏差	23.28	24.68	24.41	23.63		24.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3235##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査