

表 1139 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	135 (%)	266 (0.6)	1,175 (2.7)	3,331 (7.8)	1,434 (3.4)	11,392 (26.6)	12,782 (29.9)	7,696 (18.0)	948 (2.2)	2,185 (5.1)	1,004 (2.3)	288 (0.7)	94 (0.2)	61 (0.1)	42,791 (100.0)	1,354 771	44,145 24,229	9.11 9.23	0.71 0.74
女性	90 (%)	130 (0.6)	550 (2.3)	1,420 (6.1)	585 (2.5)	5,353 (22.8)	7,046 (30.0)	4,941 (21.1)	636 (2.7)	1,566 (6.7)	753 (3.2)	258 (1.1)	81 (0.3)	49 (0.2)	23,458 (100.0)				
合計	225 (%)	396 (0.6)	1,725 (2.6)	4,751 (7.2)	2,019 (3.0)	16,745 (25.3)	19,828 (29.9)	12,637 (19.1)	1,584 (2.4)	3,751 (5.7)	1,757 (2.7)	546 (0.8)	175 (0.3)	110 (0.2)	66,249 (100.0)	2,125 68,374	68,374 2,125	9.15 9.15	0.72 0.72
記載なし (%)																			
総計	225 (%)	396 (0.6)	1,725 (2.6)	4,751 (7.2)	2,019 (3.0)	16,745 (25.3)	19,828 (29.9)	12,637 (19.1)	1,584 (2.4)	3,751 (5.7)	1,757 (2.7)	546 (0.8)	175 (0.3)	110 (0.2)	66,249 (100.0)	2,125 68,374	68,374 2,125	9.15 9.15	0.72 0.72

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4040#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査