

表 1140 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	4 (1.8)	4 (1.8)	11 (4.9)	23 (10.2)	10 (4.4)	55 (24.4)	67 (29.8)	28 (12.4)	6 (2.7)	9 (4.0)	6 (2.7)	1 (0.4)		1 (0.4)	225 (100.0)	9 234	8.95	0.87	
30歳~ (%)	18 (0.5)	28 (0.8)	119 (3.3)	298 (8.3)	99 (2.8)	920 (25.8)	1,050 (29.4)	641 (18.0)	84 (2.4)	208 (5.8)	75 (2.1)	21 (0.6)	5 (0.1)	4 (0.1)	3,570 (100.0)	119 3,689	9.10	0.72	
45歳~ (%)	59 (0.4)	109 (0.7)	427 (2.9)	1,080 (7.4)	481 (3.3)	3,592 (24.6)	4,323 (29.6)	2,807 (19.2)	347 (2.4)	811 (5.6)	398 (2.7)	93 (0.6)	32 (0.2)	25 (0.2)	14,584 (100.0)	450 15,034	9.14	0.73	
60歳~ (%)	94 (0.3)	165 (0.5)	776 (2.6)	2,168 (7.1)	888 (2.9)	7,611 (25.0)	9,058 (29.8)	5,935 (19.5)	736 (2.4)	1,768 (5.8)	790 (2.6)	275 (0.9)	88 (0.3)	50 (0.2)	30,402 (100.0)	927 31,329	9.16	0.72	
75歳~ (%)	49 (0.3)	88 (0.5)	383 (2.3)	1,135 (6.8)	519 (3.1)	4,344 (26.1)	5,087 (30.6)	3,057 (18.4)	392 (2.4)	901 (5.4)	463 (2.8)	149 (0.9)	45 (0.3)	29 (0.2)	16,641 (100.0)	588 17,229	9.16	0.72	
90歳~ (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	9 (1.1)	47 (5.7)	22 (2.7)	223 (27.0)	243 (29.4)	169 (20.4)	19 (2.3)	54 (6.5)	25 (3.0)	7 (0.8)	5 (0.6)	1 (0.1)	827 (100.0)	32 859	9.22	0.68	
合計	225 (0.3)	396 (0.6)	1,725 (2.6)	4,751 (7.2)	2,019 (3.0)	16,745 (25.3)	19,828 (29.9)	12,637 (19.1)	1,584 (2.4)	3,751 (5.7)	1,757 (2.7)	546 (0.8)	175 (0.3)	110 (0.2)	66,249 (100.0)	2,125 68,374	9.15	0.72	
不明 (%)																			
記載なし (%)																			
総計	225 (0.3)	396 (0.6)	1,725 (2.6)	4,751 (7.2)	2,019 (3.0)	16,745 (25.3)	19,828 (29.9)	12,637 (19.1)	1,584 (2.4)	3,751 (5.7)	1,757 (2.7)	546 (0.8)	175 (0.3)	110 (0.2)	66,249 (100.0)	2,125 68,374	9.15	0.72	
平均	63.41	63.71	64.36	65.37	65.96	66.27	66.18	66.05	66.16	65.99	66.40	67.40	67.66	66.15	66.05	66.65	66.07		
標準偏差	13.84	13.07	12.85	12.65	12.48	12.54	12.46	12.27	12.43	12.34	12.17	11.98	11.88	13.39	12.47	12.68	12.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4041##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査