

表 1195 PTH値(pg/mL) 治療方法別(透析患者全体) PTH測定法:whole-PTH

治療方法	20未満	20~	35~	50~	75~	100~	125~	150~	151~	180~	210~	240~	300~	350~	400~	500~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	1,280 (8.0)	1,695 (10.5)	1,707 (10.6)	2,577 (16.0)	2,212 (13.7)	1,791 (11.1)	1,319 (8.2)	49 (0.3)	968 (6.0)	713 (4.4)	465 (2.9)	539 (3.3)	251 (1.6)	148 (0.9)	181 (1.1)	204 (1.3)	16,099 (100.0)	410	16,509	110.91	116.49
血液透析濾過 (%)	400 (7.6)	519 (9.8)	511 (9.7)	840 (15.9)	747 (14.1)	602 (11.4)	433 (8.2)	16 (0.3)	313 (5.9)	246 (4.7)	163 (3.1)	199 (3.8)	95 (1.8)	58 (1.1)	67 (1.3)	72 (1.4)	5,281 (100.0)	48	5,329	115.92	121.09
血液濾過 (%)																					
血液吸着透析 (%)	25 (18.9)	9 (6.8)	11 (8.3)	21 (15.9)	20 (15.2)	15 (11.4)	10 (7.6)	9 (6.8)	3 (2.3)	4 (3.0)	1 (0.8)	2 (1.5)	2 (1.5)			132 (100.0)		132	89.41	74.60	
在宅血液透析 (%)	3 (4.5)	7 (10.6)	9 (13.6)	12 (18.2)	8 (12.1)	6 (9.1)	6 (9.1)	1 (1.5)	5 (7.6)	1 (1.5)	1 (1.5)	3 (4.5)	1 (1.5)	2 (3.0)	1 (1.5)	66 (100.0)	1	67	116.91	122.28	
腹膜透析 (%)	39 (6.4)	48 (7.9)	58 (9.6)	92 (15.2)	70 (11.6)	71 (11.7)	55 (9.1)		39 (6.4)	35 (5.8)	23 (3.8)	30 (5.0)	17 (2.8)	9 (1.5)	10 (1.5)	605 (100.0)	38	643	128.55	120.18	
合計 (%)	1,747 (7.9)	2,278 (10.3)	2,296 (10.4)	3,542 (16.0)	3,057 (13.8)	2,485 (11.2)	1,823 (8.2)	66 (0.3)	1,334 (6.0)	998 (4.5)	656 (3.0)	772 (3.5)	365 (1.6)	218 (1.0)	259 (1.2)	287 (1.3)	22,183 (100.0)	497	22,680	112.47	117.57
記載なし (%)																					
総計 (%)	1,747 (7.9)	2,278 (10.3)	2,296 (10.4)	3,542 (16.0)	3,057 (13.8)	2,485 (11.2)	1,823 (8.2)	66 (0.3)	1,334 (6.0)	998 (4.5)	656 (3.0)	772 (3.5)	365 (1.6)	218 (1.0)	259 (1.2)	287 (1.3)	22,183 (100.0)	497	22,680	112.47	117.57

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4250##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査