

表 1231 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	17 (%)	23 (0.1)	98 (0.2)	344 (0.8)	1,445 (3.4)	5,497 (12.8)	14,040 (32.8)	13,424 (31.3)	5,542 (12.9)	1,671 (3.9)	760 (1.8)	42,861 (100.0)	1,284	44,145	10.98	1.26
女性	13 (%)	15 (0.1)	50 (0.2)	265 (1.1)	982 (4.2)	3,744 (15.9)	8,266 (35.2)	6,941 (29.5)	2,473 (10.5)	580 (2.5)	178 (0.8)	23,507 (100.0)	722	24,229	10.77	1.18
合計	30 (%)	38 (0.1)	148 (0.2)	609 (0.9)	2,427 (3.7)	9,241 (13.9)	22,306 (33.6)	20,365 (30.7)	8,015 (12.1)	2,251 (3.4)	938 (1.4)	66,368 (100.0)	2,006	68,374	10.91	1.24
記載なし (%)																
総計	30 (%)	38 (0.1)	148 (0.2)	609 (0.9)	2,427 (3.7)	9,241 (13.9)	22,306 (33.6)	20,365 (30.7)	8,015 (12.1)	2,251 (3.4)	938 (1.4)	66,368 (100.0)	2,006	68,374	10.91	1.24

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4330##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査