

表 1234 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 原疾患 | 5未満 | 5~ | 6~ | 7~ | 8~ | 9~ | 10~ | 11~ | 12~ | 13~ | 14~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------|------|
| 慢性糸球体腎炎 | 10 (%) | 9 (0.0) | 51 (0.0) | 178 (0.2) | 726 (0.8) | 2,897 (3.3) | 7,245 (13.3) | 6,906 (33.4) | 2,674 (31.8) | 739 (12.3) | 277 (3.4) | 21,712 (1.3) | 676 (100.0) | 22,388 (100.0) | 10.93 | 1.21 | | |
| 慢性腎孟腎炎 | | | 1 (%) | 3 (0.2) | 16 (0.5) | 83 (2.6) | 227 (13.7) | 169 (37.5) | 78 (27.9) | 18 (12.9) | 10 (3.0) | 605 (1.7) | 22 (100.0) | 627 (100.0) | 10.93 | 1.20 | | |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 1 (%) | | | 5 (0.2) | 24 (1.1) | 71 (5.0) | 167 (14.9) | 133 (35.1) | 49 (27.9) | 21 (10.3) | 5 (4.4) | 476 (1.1) | 8 (100.0) | 484 (100.0) | 10.82 | 1.26 | | |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 | | | | 6 (%) | 17 (1.4) | 96 (3.8) | 130 (21.7) | 127 (29.3) | 56 (28.7) | 8 (12.6) | 3 (1.8) | 443 (0.7) | 16 (100.0) | 459 (100.0) | 10.74 | 1.18 | | |
| その他の分類不能の腎炎 | | | 1 (%) | 1 (0.3) | 11 (0.3) | 46 (3.2) | 121 (13.4) | 111 (35.3) | 40 (32.4) | 8 (11.7) | 4 (2.3) | 343 (1.2) | 12 (100.0) | 355 (100.0) | 10.92 | 1.12 | | |
| 多発性囊胞腎 | | | 3 (%) | 22 (0.1) | 66 (0.9) | 296 (2.6) | 822 (11.8) | 790 (32.9) | 330 (31.6) | 99 (13.2) | 73 (4.0) | 2,501 (2.9) | 68 (100.0) | 2,569 (100.0) | 11.09 | 1.30 | | |
| 腎硬化症 | 4 (%) | 1 (0.1) | 16 (0.0) | 60 (0.3) | 228 (1.0) | 797 (4.0) | 2,013 (13.9) | 1,758 (35.1) | 652 (30.6) | 153 (11.4) | 61 (2.7) | 5,743 (1.1) | 153 (100.0) | 5,896 (100.0) | 10.84 | 1.19 | | |
| 悪性高血圧 | | | | 3 (%) | 27 (0.6) | 68 (5.0) | 176 (12.7) | 151 (32.8) | 90 (28.2) | 16 (16.8) | 5 (3.0) | 536 (0.9) | 19 (100.0) | 555 (100.0) | 10.95 | 1.21 | | |
| 糖尿病性腎症 | 11 (%) | 16 (0.0) | 56 (0.1) | 212 (0.2) | 908 (0.9) | 3,472 (3.8) | 7,972 (14.6) | 7,068 (33.5) | 2,872 (29.7) | 813 (12.1) | 388 (3.4) | 23,788 (1.6) | 728 (100.0) | 24,516 (100.0) | 10.90 | 1.26 | | |
| SLE腎炎 | | 2 (%) | 2 (0.4) | 9 (0.4) | 31 (1.7) | 51 (5.9) | 185 (9.8) | 155 (35.4) | 61 (29.6) | 18 (11.7) | 9 (3.4) | 523 (1.7) | 14 (100.0) | 537 (100.0) | 10.86 | 1.34 | | |
| アミロイド腎 | | | 2 (%) | 3 (2.1) | 8 (3.1) | 34 (8.3) | 27 (35.4) | 27 (28.1) | 19 (19.8) | 2 (2.1) | 1 (1.0) | 96 (1.0) | 2 (100.0) | 98 (100.0) | 10.99 | 1.26 | | |
| 痛風腎 | | | 1 (%) | 7 (0.5) | 28 (3.2) | 75 (12.7) | 75 (33.9) | 26 (33.9) | 7 (11.8) | 2 (3.2) | 2 (0.9) | 221 (100.0) | 6 (100.0) | 227 (100.0) | 10.95 | 1.11 | | |
| 先天性代謝異常による腎不全 | | | 2 (%) | 2 (2.8) | 9 (2.8) | 22 (12.7) | 25 (31.0) | 9 (35.2) | 2 (12.7) | 2 (2.8) | 71 (100.0) | 2 (100.0) | 73 (100.0) | 10.87 | 1.09 | | | |
| 腎・尿路結核 | | | | | 4 (%) | 7 (9.3) | 14 (16.3) | 12 (32.6) | 6 (27.9) | 6 (14.0) | 43 (100.0) | 1 (100.0) | 44 (100.0) | 10.68 | 1.08 | | | |
| 腎・尿路結石 | | 2 (%) | 1 (1.8) | 2 (0.9) | 13 (1.8) | 43 (11.9) | 34 (39.4) | 7 (31.2) | 6 (6.4) | 1 (5.5) | 1 (0.9) | 109 (100.0) | 4 (100.0) | 113 (100.0) | 10.83 | 1.24 | | |
| 腎・尿路腫瘍 | 2 (%) | | 1 (1.1) | 10 (0.5) | 25 (5.4) | 60 (13.5) | 52 (32.4) | 25 (28.1) | 8 (13.5) | 2 (4.3) | 2 (1.1) | 185 (100.0) | 5 (100.0) | 190 (100.0) | 10.90 | 1.38 | | |
| 閉塞性尿路障害 | | | | | 4 (%) | 17 (2.7) | 61 (11.3) | 42 (40.7) | 20 (28.0) | 5 (13.3) | 1 (3.3) | 150 (0.7) | 1 (100.0) | 151 (100.0) | 10.97 | 1.07 | | |
| 骨髄腫 | | | 1 (%) | 3 (2.7) | 3 (8.1) | 5 (8.1) | 10 (13.5) | 11 (27.0) | 3 (29.7) | 1 (8.1) | 1 (2.7) | 37 (100.0) | 37 (100.0) | 37 (100.0) | 10.33 | 1.51 | | |
| 腎形成不全 | 1 (%) | | | | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 22 (0.6) | 56 (13.2) | 46 (33.5) | 28 (27.5) | 9 (16.8) | 3 (5.4) | 3 (1.8) | 167 (100.0) | 4 (100.0) | 171 (100.0) | 11.11 | 1.31 |
| 不明 | 3 (%) | 6 (0.0) | 11 (0.1) | 75 (0.2) | 236 (1.2) | 915 (3.7) | 2,097 (14.5) | 1,978 (33.2) | 706 (31.3) | 227 (11.2) | 63 (3.6) | 6,317 (1.0) | 214 (100.0) | 6,531 (100.0) | 10.87 | 1.24 | | |
| 再導入 | | | | | 1 (%) | 8 (1.3) | 25 (4.1) | 72 (11.8) | 204 (33.3) | 79 (30.9) | 26 (12.9) | 8 (4.2) | 8 (1.3) | 612 (100.0) | 21 (100.0) | 633 (100.0) | 10.96 | 1.27 |
| その他 | 2 (%) | | 3 (0.1) | 16 (0.2) | 76 (0.9) | 243 (4.5) | 572 (14.4) | 506 (33.8) | 185 (29.9) | 65 (10.9) | 22 (3.8) | 1,690 (1.3) | 30 (100.0) | 1,720 (100.0) | 10.87 | 1.26 | | |
| 合計 | 30 (%) | 38 (0.0) | 148 (0.1) | 609 (0.2) | 2,427 (0.9) | 9,241 (3.7) | 22,306 (13.9) | 20,365 (33.6) | 8,015 (30.7) | 2,251 (12.1) | 938 (3.4) | 66,368 (1.4) | 2,006 (100.0) | 68,374 (100.0) | 10.91 | 1.24 | | |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 30 (%) | 38 (0.0) | 148 (0.1) | 609 (0.2) | 2,427 (0.9) | 9,241 (3.7) | 22,306 (13.9) | 20,365 (33.6) | 8,015 (30.7) | 2,251 (12.1) | 938 (3.4) | 66,368 (1.4) | 2,006 (100.0) | 68,374 (100.0) | 10.91 | 1.24 | | |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D433##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査