

表 1412 使用透析液の種類 性別（腹膜透析単独患者）

性別	1.5%液 のみ (イコデキストリン なし)	1.5%液と 2.5%液の 併用 (イコデキストリン なし)	2.5%液 のみ (イコデキストリン なし)	4.25%液 のみ (イコデキストリン なし)	イコデキストリン 単独 (ブドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性	1,290	284	68	2	33	869	282	205	2	3,035	11	1,363	4,409
(%)	(42.5)	(9.4)	(2.2)	(0.1)	(1.1)	(28.6)	(9.3)	(6.8)	(0.1)	(100.0)			
女性	727	188	50	3	24	409	175	160	5	1,741	2	779	2,522
(%)	(41.8)	(10.8)	(2.9)	(0.2)	(1.4)	(23.5)	(10.1)	(9.2)	(0.3)	(100.0)			
合計	2,017	472	118	5	57	1,278	457	365	7	4,776	13	2,142	6,931
(%)	(42.2)	(9.9)	(2.5)	(0.1)	(1.2)	(26.8)	(9.6)	(7.6)	(0.1)	(100.0)			
記載なし													
(%)													
総計	2,017	472	118	5	57	1,278	457	365	7	4,776	13	2,142	6,931
(%)	(42.2)	(9.9)	(2.5)	(0.1)	(1.2)	(26.8)	(9.6)	(7.6)	(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5221##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査