

表 1433 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満	29	12	8	6	3		58	27	85	277.98	387.51
(%)	(50.0)	(20.7)	(13.8)	(10.3)	(5.2)		(100.0)				
15歳～	20	7	6	14	1	2	50	44	94	479.04	537.35
(%)	(40.0)	(14.0)	(12.0)	(28.0)	(2.0)	(4.0)	(100.0)				
30歳～	99	49	62	51	42	36	339	269	608	668.44	695.81
(%)	(29.2)	(14.5)	(18.3)	(15.0)	(12.4)	(10.6)	(100.0)				
45歳～	325	233	229	256	132	96	1,271	1,012	2,283	622.02	607.45
(%)	(25.6)	(18.3)	(18.0)	(20.1)	(10.4)	(7.6)	(100.0)				
60歳～	433	386	464	442	256	164	2,145	1,573	3,718	665.30	580.66
(%)	(20.2)	(18.0)	(21.6)	(20.6)	(11.9)	(7.6)	(100.0)				
75歳～	125	198	283	209	91	36	942	759	1,701	621.93	475.39
(%)	(13.3)	(21.0)	(30.0)	(22.2)	(9.7)	(3.8)	(100.0)				
90歳～	4	14	23	10	5		56	70	126	567.86	378.12
(%)	(7.1)	(25.0)	(41.1)	(17.9)	(8.9)		(100.0)				
合計	1,035	899	1,075	988	530	334	4,861	3,754	8,615	638.14	575.55
(%)	(21.3)	(18.5)	(22.1)	(20.3)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				
不明											
(%)											
記載なし											
(%)											
総計	1,035	899	1,075	988	530	334	4,861	3,754	8,615	638.14	575.55
(%)	(21.3)	(18.5)	(22.1)	(20.3)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				
平均	58.69	63.94	65.83	63.85	63.36	60.78	62.94	63.43	63.16		
標準偏差	15.86	14.60	14.07	13.93	12.87	11.72	14.49	14.47	14.48		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5413##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査