

表 1496 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	3,765 (85.5)	460 (10.4)	121 (2.7)	25 (0.6)	14 (0.3)	21 (0.5)	4,406 (100.0)		2,525	6,931	0.24	0.87
PD.HD併用週1HD(F) (%)	764 (87.6)	87 (10.0)	14 (1.6)	4 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.2)	872 (100.0)		624	1,496	0.17	0.61
PD.HD併用週2HD(F) (%)	36 (83.7)	7 (16.3)					43 (100.0)		77	120	0.17	0.39
PD.HD併用週3HD(F) (%)												
PD.HD併用週4HD(F) (%)												
PD.HD併用その他 (%)	28 (84.8)	3 (9.1)	2 (6.1)				33 (100.0)		16	49	0.21	0.55
合計 (%)	4,593 (85.8)	557 (10.4)	137 (2.6)	29 (0.5)	15 (0.3)	23 (0.4)	5,354 (100.0)		3,242	8,596	0.23	0.83
不明 (%)	1 (100.0)						1 (100.0)		3	4		
記載なし (%)									15	15		
総計 (%)	4,594 (85.8)	557 (10.4)	137 (2.6)	29 (0.5)	15 (0.3)	23 (0.4)	5,355 (100.0)		3,260	8,615	0.23	0.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

D5911##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査