

表 1538 残腎Kt/V 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独	307	474	574	382	229	45	35	24	2,070	4,861	6,931	0.64	0.60
(%)	(14.8)	(22.9)	(27.7)	(18.5)	(11.1)	(2.2)	(1.7)	(1.2)	(100.0)				
PD.HD併用週1HD(F)	231	96	32	6	13	3	1	1	383	1,113	1,496	0.17	0.36
(%)	(60.3)	(25.1)	(8.4)	(1.6)	(3.4)	(0.8)	(0.3)	(0.3)	(100.0)				
PD.HD併用週2HD(F)	11	3	1						15	105	120	0.07	0.14
(%)	(73.3)	(20.0)	(6.7)						(100.0)				
PD.HD併用週3HD(F)													
(%)													
PD.HD併用週4HD(F)													
(%)													
PD.HD併用その他	2	3	1	1					7	42	49	0.33	0.31
(%)	(28.6)	(42.9)	(14.3)	(14.3)					(100.0)				
合計	551	576	608	389	242	48	36	25	2,475	6,121	8,596	0.56	0.59
(%)	(22.3)	(23.3)	(24.6)	(15.7)	(9.8)	(1.9)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
不明										4	4		
(%)													
記載なし										15	15		
(%)													
総計	551	576	608	389	242	48	36	25	2,475	6,140	8,615	0.56	0.59
(%)	(22.3)	(23.3)	(24.6)	(15.7)	(9.8)	(1.9)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D6211##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査