

膠原病の主な臨床症状

	RA	SLE	SSc	PM/DM	シェーグレン 症候群	MCTD	MPA
発熱	△	◎	△	○	○	○	◎
体重減少	△	○	△	○	△	△	◎
高血圧			○				
日光過敏症		◎		○		○	
蝶形紅斑		◎		○		○	
円板状紅斑		○				△	
ヘリオトロープ疹				◎		○	
皮下結節	◎						
皮膚硬化			◎			○	
指尖潰瘍	○	○	◎	○		○	○
レイノー現象	△	○	◎	○	○	◎	△
関節炎	◎	○	○	○	○	○	○
関節破壊	◎					△	
筋力低下	○	△	△	◎		○	○
乾燥性角結膜炎					◎	○	
口内乾燥					◎	○	
口内潰瘍		◎			○	○	
上気道病変					○	○	○
食道蠕動低下			◎	○		◎	
肺線維症/ 間質性肺炎	◎	△	◎	◎	○	○	◎
胸膜炎	○	◎	○	○	△	◎	○
心外膜炎	△	◎	○	○	△	○	○
心(筋)炎	△	○	○	○	△	△	○
腎障害		◎	○		○		◎
急速進行性腎炎		△	△				◎
多発性単神経炎	○	○					◎
痙攣発作		◎				△	△
精神症状		◎					△
消化管出血梗塞	△	△				△	○
臓器梗塞	○*	○					△


◎：よくみられる、○：みられることがある、△：時々みられる

○*：MRAの場合

 ：診断基準に含まれている項目

順天堂大学 名誉教授 橋本博史先生よりご提供
参考文献：橋本博史，総合臨床，43，1068，1994

全身症状(発熱、高血圧、体重減少、末梢神経障害、痙攣発作)



RA: 関節リウマチ, SLE: 全身性エリテマトーデス, PM/DM: 多発性筋炎/皮膚筋炎,
SSc: 全身性強皮症, MCTD: 混合性結合組織病, MPA: 顕微鏡的多発血管炎,
GPA: 多発血管炎肉芽腫症, MRA: 悪性関節リウマチ, SS: シェーグレン症候群