

表1 薬剤起因性老年症候群で見られる症候と主な原因薬剤

症候	薬剤
ふらつき・転倒	降圧薬 (特に中枢性交感神経抑制薬, α 遮断薬*, β 遮断薬**), 睡眠薬, 抗不安薬, 抗うつ薬 (三環系), 抗てんかん薬, 抗精神病薬 (フェノチアジン系), パーキンソン病治療薬 (トリヘキシフェニジル), 抗ヒスタミン薬
抑うつ	降圧薬 (中枢性交感神経抑制薬, β 遮断薬), H_2 ブロッカー, 抗不安薬, 抗精神病薬, 甲状腺疾患治療薬
記憶障害	降圧薬 (中枢性交感神経抑制薬, α 遮断薬, β 遮断薬), 睡眠薬・抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系), 抗うつ薬 (三環系), 抗てんかん薬, 抗精神病薬 (フェノチアジン系), パーキンソン病治療薬, 抗ヒスタミン薬, H_2 ブロッカー
せん妄	パーキンソン病治療薬, 睡眠薬, 抗不安薬, 抗うつ薬 (三環系), 抗ヒスタミン薬, H_2 ブロッカー, 副腎皮質ステロイド, 降圧薬 (中枢性交感神経抑制薬, β 遮断薬), ジギタリス製剤, 抗不整脈薬 (リドカイン, メキシレチン), 気管支拡張薬 (テオフィリン, アミノフェリン)
食欲低下	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs), アスピリン, 緩下剤, 抗菌薬, ビスホスホネート製剤, 抗不安薬, 抗精神病薬, パーキンソン病治療薬 (トリヘキシフェニジル)
便秘	睡眠薬・抗不安薬 (ベンゾジアゼピン), 抗うつ薬 (三環系), 膀胱鎮痙薬, 腸管鎮痙薬 (ブチルスコポラミン, プロパンテリン), H_2 ブロッカー, α グルコシダーゼ阻害薬, 抗精神病薬 (フェノチアジン系), パーキンソン病治療薬 (トリヘキシフェニジル)
排尿障害・尿失禁	抗うつ薬 (三環系), 腸管鎮痙薬 (ブチルスコポラミン, プロパンテリン), 膀胱鎮痙薬, H_2 ブロッカー, 睡眠薬・抗不安薬 (ベンゾジアゼピン), 抗精神病薬 (フェノチアジン系), パーキンソン病治療薬 (トリヘキシフェニジル), α 遮断薬, 利尿薬

*前立腺肥大症に用いる α_1 受容体遮断薬は含まない。

**心不全や不整脈に対して用いる β 遮断薬は含まない。